

WSKAZANIA DO REWASKULARYZACJI CHIRURGICZNEJ
M. SERCOWEGO
WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO 2010

Wskazania do rewaskularyzacji u chorych

ze stabilną dławicą piersiową lub

niemym niedokrwieniem m. sercowego:

1. Zwężenie pnia lewej t. wieńcowej (izolowane lub choroba jednonaczyniowa) ujście lub środkowy odcinek

Klasa zaleceń: I, Poziom wiarygodności danych: A

2. Zwężenie pnia lewej t. wieńcowej (izolowane lub choroba jednonaczyniowa) odcinek dystalny lub rozwidlenie

Klasa zaleceń: I, Poziom wiarygodności danych: A

3. Zwężenie pnia lewej t. wieńcowej + choroba 2 lub 3 naczyniowa, w skali Syntax \leq 32 punkty

Klasa zaleceń: I, Poziom wiarygodności danych: A

4. Zwężenie pnia lewej t. wieńcowej + choroba 2 lub 3 naczyniowa, w skali Syntax \geq 33 punkty

Klasa zaleceń: I, Poziom wiarygodności danych: A

5. Choroba 3 naczyniowa z prostymi zmianami, w skali Syntax \leq 22 punkty

Klasa zaleceń: I, Poziom wiarygodności danych: A

6. Choroba 3 naczyniowa ze złożonymi zmianami, w skali Syntax $>$ 22 punkty

Klasa zaleceń: I, Poziom wiarygodności danych: A

7. Choroba 1 lub 2 naczyniowa ze zwężeniem w proksymalnym odcinku LAD

Klasa zaleceń: I, Poziom wiarygodności danych: A

8. Choroba 1 lub 2 naczyniowa bez zwężenia w proksymalnym odcinku LAD

Klasa zaleceń: IIb, Poziom wiarygodności danych: C